

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
лекарственного средства
ВЕНОЛЕКС 600

информация для пациентов

Название лекарственного средства:

Торговое название: Венолекс 600.

Международное непатентованное название: Diosmin.

Описание: Таблетки овальные, светло-коричневого цвета, с вкраплениями от светло-коричневого до темно-коричневого цвета.

Состав на одну таблетку:

активное вещество: диосмин 600 мг;

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кроскармеллоза натрия, гипромеллоза, магния стеарат.

Лекарственная форма: таблетки.

Фармакотерапевтическая группа:

Средства, снижающие проницаемость капилляров. Биофлавоноиды.

Код АТС: C05CA03.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

- для уменьшения симптомов лимфovenозной недостаточности нижних конечностей: ощущение тяжести или усталости в ногах, боль;
- дополнительное лечение при нарушении микроциркуляции;
- симптоматическая терапия острого геморроя.

Способ применения и дозировка:

Перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом. Препарат предназначен для приема внутрь.

При варикозном расширении вен нижних конечностей и хронической лимфovenозной недостаточности (отеки, боли, судороги) назначают по 1 таблетке в сутки утром натощак.

При обострении геморроя препарат назначают по 2-3 таблетки в сутки во время еды. Если пропущен один или несколько приемов препарата, необходимо продолжать применение препарата в обычном режиме и в обычной дозе.

Продолжительность приема определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Побочное действие:

В редких случаях повышенная чувствительность к компонентам препарата, требующая перерыва в лечении: со стороны желудочно-кишечного тракта - диспептические расстройства (изжога, тошнота, боли в животе), со стороны центральной нервной системы - головная боль.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет, беременность (I триместр) (опыт применения ограничен).

Передозировка:

Симптомы передозировки не описаны.

Особые указания:

Лечение острого приступа геморроя проводят в комплексе с другими препаратами, при этом прием Веноекса 600 не заменяет специального лечения других заболеваний аноректальной области.

При отсутствии быстрого клинического эффекта необходимо провести дополнительное обследование и скорректировать проводимую терапию.

Если дискомфорт и ломкость сосудов не уменьшаются в течение 15 дней, обратитесь к врачу.

Если геморроидальные нарушения сохраняются после нескольких дней лечения, необходимо проконсультироваться с врачом.

Эффективность приема Веноекса 600 повышается в сочетании со здоровым образом жизни. Избегайте воздействия высокой внешней температуры, инсоляции, длительного пребывания в положении стоя, избыточной массы тела. Пешие прогулки, ношение лечебного компрессионного трикотажа способствуют улучшению циркуляции крови в нижних конечностях.

Беременность и грудное вскармливание:

До сих пор в клинической практике не было сообщений о каких-либо побочных эффектах при применении препарата у беременных. Применение в период беременности во II и III триместрах возможно только по назначению врача в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

В экспериментальных исследованиях не было выявлено тератогенного воздействия на плод. Во время грудного вскармливания не рекомендуется прием препарата, т. к. отсутствуют данные о проникновении препарата в грудное молоко.

Применение у детей:

Нет данных.

Влияние на способность управлять транспортными средствами:

Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимых эффектов взаимодействия с другими лекарственными средствами не описано.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта врача.

Упаковка:

По 8 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки (ПВХ) и фольги алюминиевой.

По 3 или 6 контурных ячейковых упаковок с инструкцией по применению в картонной пачке.

Производитель:

ООО «Рубикон», РБ, 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,

тел: +375 (212) 36-47-77, тел/факс +375 (212) 36-37-06, e-mail: secretar@rubikon.by

