



**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
лекарственного средства  
**ЛАКТРИОЛ**

информация для пациентов

**Название лекарственного средства:**

*Торговое название:* Лактриол

*Международное непатентованное название:* лактобактерии ацидофильные (*lactobacillus acidophilus*).

**Описание:** Суппозитории торпедовидной формы от белого до белого с желтоватым оттенком цвета. Допускается неоднородность окраски в виде мраморности и наличие воронкообразного углубления.

**Состав на один суппозиторий:**

активное вещество: лактобактерии ацидофильные — не менее  $10^7$  КОЕ;

вспомогательные вещества: лактоза моногидрат, макрогола цетостеариловый эфир, жир твердый.

**Лекарственная форма:** Суппозитории вагинальные.

**Фармакотерапевтическая группа:** Антисептические и противомикробные средства для применения в гинекологии (исключая комбинации с кортикостероидами). Прочие антисептики и противомикробные средства. Лактобактерии.

**Показания к применению:**

Лактриол назначается для нормализации влагалищного микробиоценоза в комплексной терапии неспецифических воспалительных процессов влагалища.

Показания:

- для нормализации влагалищного микробиоценоза в составе комплексной или в качестве монотерапии при лечении неспецифических бактериальных кольпитов, включая гарднереллез, в том числе у беременных женщин;
- подострые и хронические стадии воспалительных процессов женской половой сферы (назначают после окончания курса антибактериальной терапии с целью реабилитации);
- гормонозависимые кольпиты, включая сенильные (назначают как самостоятельное средство или в комплексе с гормонотерапией);
- подготовка к плановым гинекологическим операциям с целью профилактики послеоперационных инфекционных осложнений;
- в качестве вспомогательного средства в сочетании и после специфической антимикробной, противовирусной и иммуномодулирующей терапии при лечении урогенитальных инфекций и заболеваний, передающихся половым путем (гонореи, урогенитального хламидиоза, урогенитального герпеса и др.). Назначают после антибактериальной терапии с целью нормализации влагалищного микробиоценоза.

**Способ применения и дозировка:**

При лечении гормонозависимых кольпитов, включая сенильные, а также неспецифических бактериальных кольпитов, препарат применяют по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 5-10 дней.

У беременных женщин при нарушении чистоты вагинального секрета III-IV степени препарат применяют по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки в течение 5-10 и более дней под контролем восстановления чистоты вагинального секрета до I-II степени и исчезновения клинических симптомов.

С целью профилактики гнойно-септических осложнений применяют по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки в течение 5-10 дней до предполагаемой операции или родоразрешения.

С целью восстановительной терапии после применения антибиотиков применяют по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки в течение 10 дней. Курс повторяют по назначению врача через 10-20 дней.

**Побочное действие:** не выявлено.

**Противопоказания:** не выявлены.

Не рекомендуется применять при вульвовагинальных кандидозах.

**Меры предосторожности:**

Не рекомендуется одновременное местное применение антибактериальных препаратов.

В случае ухудшения или отсутствия эффекта после полного курса терапии следует проконсультироваться с врачом.

**Применение во время беременности и лактации:**

Лактобактерии являются представителями нормальной микрофлоры человека. Поэтому, препараты, изготовленные на их основе, могут применяться при беременности и в период лактации.

**Применение в детском возрасте:**

Данные по эффективности и безопасности у детей и подростков до 18 лет отсутствуют.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами:**

Не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** применение Лактриола возможно сочетать с одновременным назначением антимикробной, противовирусной и иммуномодулирующей терапии. Не рекомендуется одновременное вагинальное применение антибактериальных препаратов и суппозитория Лактриол.

**Условия хранения:**

Хранить при температуре от 2 °С до 8 °С.

*Хранить в недоступном для детей месте!*

**Срок годности:**

1 год. Не применять по истечении срока годности!

**Условия отпуска:**

Без рецепта.

**Упаковка:** По 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке. По 2 контурные ячейковые упаковки в картонной пачке с инструкцией по применению.

**Производитель:**

ООО «Рубикон», РБ, 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62 Б, тел: +375 (212) 36-47-77, тел/факс: +375 (212) 36-37-06, [www.rubikon.by](http://www.rubikon.by), e-mail: [secretar@rubikon.by](mailto:secretar@rubikon.by)

