



ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

ШАЛФЕЙ

информация для специалистов

Название лекарственного средства:

Торговое название: Шалфей

Международное непатентованное название: нет

Описание: Таблетки цилиндрические, двояковыпуклые, от светло-серого до светло-коричневого цвета, с вкраплениями от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, со специфическим запахом.

Состав на одну таблетку:

активное вещество: шалфея листьев экстракт сухой - 12,5 мг (содержит не менее 2,5 % розмариновой кислоты. Экстрагент: этанол (75 %): вода (1:10), об/об; соотношение исходного лекарственного растительного сырья к полученному экстракту – 10:1).

вспомогательные вещества: шалфея испанского масло, лимонная кислота безводная, сахарин натрий, ароматическая добавка «Мед» (медовый эфир, масло герани, этилбутират, этилмальтол (E637), мальтодекстрин, мальтол, декстроза (E1200), сипернат), магния стеарат, сорбитол.

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие средства для местного лечения заболеваний полости рта.

Код АТС: A01AD11

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, содержащий комплекс биологически активных веществ. Оказывает противовоспалительное, противомикробное действие, обладает вяжущими свойствами.

Фармакокинетика

Лекарственное средство содержит различные биологически активные вещества, исследования фармакокинетики не проводились.

Показания к применению:

В комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта и глотки (стоматит, гингивит, тонзиллит, фарингит).

Способ применения и дозировка:

Местно. Держать во рту до полного рассасывания, не разжевывая.

Взрослые: по 1 таблетке с интервалом в 2 часа. Максимально 6 таблеток в день.

Длительность терапии определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Пациенты пожилого возраста: коррекция дозы не требуется.

Дети: препарат противопоказан детям и подросткам до 18 лет.

Пациенты с нарушением функции печени и почек: коррекция дозы не требуется.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу!

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Передозировка:

Передозировка при приеме внутрь более 15 г листьев шалфея (около 26 таблеток настоящего лекарственного средства) может проявляться ощущением жара, развитием тахикардии, головокружения и эпилептических судорог.

Лечение симптоматическое.

В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу!

Меры предосторожности:

Не следует превышать рекомендуемые дозы препарата. Не рекомендуется применять лекарственное средство более одной недели.

Лекарственное средство не рекомендуется применять пациентам с врожденной непереносимостью фруктозы. Может оказывать легкое слабительное действие.

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Применение в период беременности и в период грудного вскармливания:

Безопасность применения при беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием данных применять во время беременности и в период кормления грудью противопоказано. Туйон, входящий в состав листьев шалфея, может оказать неблагоприятное влияние на течение беременности.

Применение в детском возрасте:

В связи с отсутствием достаточных данных применять у детей до 18 лет не рекомендуется.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами:

Применение лекарственного средства может повлиять на способность управлять автомобилем и работать с механизмами. Во время лечения пациентам не рекомендовано управлять автомобилем или работать с техникой.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Прием препаратов шалфея может повлиять на эффекты лекарственных средств, действующих через ГАМК-рецепторы (например, барбитураты, бензодиазепины). Одновременное применение с данными лекарственными средствами не рекомендовано. Препараты шалфея могут взаимодействовать с гипогликемическими и противосудорожными средствами, усиливать седативное действие других лекарственных средств и алкоголя. Лекарственное средство может влиять на всасывание железа и других минералов.

Условия хранения:

В защищенном от света и влаги месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта врача.

Упаковка:

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки (ПВХ) и фольги алюминиевой.

По 1, 2 или 3 контурных ячейковых упаковок в картонной пачке с инструкцией по применению.

Производитель:

ООО «Рубикон», РБ, 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62 Б, тел: +375 (212) 36-47-77, тел/факс: +375 (212) 36-37-06, www.rubikon.by, e-mail: secretar@rubikon.by

