



ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

ЛАКТРИОЛ

информация для специалистов

Название лекарственного средства:

Торговое название: Лактриол

Международное непатентованное название: лактобактерии ацидофильные (*Lactobacillus acidophilus*).

Описание: Суппозитории торпедовидной формы от белого до белого с желтоватым оттенком цвета. Допускается неоднородность окраски в виде мраморности и наличие воронкообразного углубления.

Состав на один суппозиторий:

активное вещество: лактобактерии ацидофильные — не менее 10^7 КОЕ;

вспомогательные вещества: лактоза моногидрат, макрогола цетостеариловый эфир, жир твердый.

Лекарственная форма: Суппозитории вагинальные.

Фармакотерапевтическая группа: Антисептические и противомикробные средства для применения в гинекологии (исключая комбинации с кортикостероидами). Прочие антисептики и противомикробные средства. Лактобактерии.

Код АТХ: G01AX14

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика: Лактриол – пробиотический препарат, содержащий антагонистически активные живые ацидофильные лактобактерии, в частности штаммы *Lactobacillus acidophilus* 100аш, КЗШ24 и NK1. Лактобактерии в препарате Лактриол лиофилизированы в среде культивирования с добавлением сахарозо-желатиново-молочной среды. Лактриол обладает антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, в том числе стафилококков, протей и энтеропатогенной кишечной палочки; способствует восстановлению микробиоценоза влагалища. Лактобактерии способствуют метаболизму гликогена до молочной кислоты, восстанавливая нормальное рН влагалища (3,8 - 4,2).

Фармакокинетика: данные отсутствуют.

Показания к применению:

Лактриол назначается для нормализации влагалищного микробиоценоза в комплексной терапии неспецифических воспалительных процессов влагалища.

Показания:

- для нормализации влагалищного микробиоценоза в составе комплексной или в качестве монотерапии при лечении неспецифических бактериальных кольпитов, включая гарднереллез, в том числе у беременных женщин;
- подострые и хронические стадии воспалительных процессов женской половой сферы (назначают после окончания курса антибактериальной терапии с целью реабилитации);
- гормонозависимые кольпиты, включая сенильные (назначают как самостоятельное средство или в комплексе с гормонотерапией);

- подготовка к плановым гинекологическим операциям с целью профилактики послеоперационных инфекционных осложнений;
- в качестве вспомогательного средства в сочетании и после специфической антимикробной, противовирусной и иммуномодулирующей терапии при лечении урогенитальных инфекций и заболеваний, передающихся половым путем (гонореи, урогенитального хламидиоза, урогенитального герпеса и др.). Назначают после антибактериальной терапии с целью нормализации влагалищного микробиоценоза.

Способ применения и дозировка:

При лечении гормонозависимых кольпитов, включая сенильные, а также неспецифических бактериальных кольпитов, препарат применяют по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 5-10 дней.

У беременных женщин при нарушении чистоты вагинального секрета III-IV степени препарат применяют по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки в течение 5-10 и более дней под контролем восстановления чистоты вагинального секрета до I-II степени и исчезновения клинических симптомов.

С целью профилактики гнойно-септических осложнений применяют по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки в течение 5-10 дней до предполагаемой операции или родоразрешения.

С целью восстановительной терапии после применения антибиотиков применяют по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки в течение 10 дней. Курс повторяют по назначению врача через 10-20 дней.

Побочное действие: не выявлено.

Противопоказания: не выявлены.

Не рекомендуется применять при вульвовагинальных кандидозах.

Меры предосторожности:

Не рекомендуется одновременное местное применение антибактериальных препаратов.

В случае ухудшения или отсутствия эффекта после полного курса терапии план лечения следует пересмотреть.

Применение во время беременности и лактации:

Лактобактерии являются представителями нормальной микрофлоры человека. Поэтому, препараты, изготовленные на их основе, могут применяться при беременности и в период лактации.

Применение в детском возрасте:

Данные по эффективности и безопасности у детей и подростков до 18 лет отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами:

Не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: применение Лактриола возможно сочетать с одновременным назначением антимикробной, противовирусной и иммуномодулирующей терапии. Не рекомендуется одновременное вагинальное применение антибактериальных препаратов и суппозиторияев Лактриол.

Условия хранения:

Хранить при температуре от 2 °С до 8 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

1 год. Не применять по истечении срока годности!

Условия отпуска:

Без рецепта.

Упаковка: По 5 суппозиторияев в контурной ячейковой упаковке. По 2 контурные ячейковые упаковки в картонной пачке с инструкцией по применению.



Производитель:

ООО «Рубикон», РБ, 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62 Б, тел: +375 (212) 36-47-77,
тел/факс: +375 (212) 36-37-06, www.rubikon.by, e-mail: secretar@rubikon.by



СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ОДРОВОХОРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства одрвоохранения
Республики Беларусь