



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
лекарственного средства
НАТАЦИН

информация для пациентов

Название лекарственного средства:

Торговое название: Натацин

Международное непатентованное название: Натамицин (Natamycin)

Описание: суппозитории торпедовидной формы, от белого с желтоватым оттенком до светло-желтого с коричневатым оттенком цвета. Допускается наличие воронкообразного углубления.

Состав на один суппозиторий:

активное вещество: натамицин 100 мг;

вспомогательные вещества: цетиловый спирт, сорбитан триолеат, полисорбат 80, натрия гидрокарбонат, адипиновая кислота, жир твердый.

Лекарственная форма: Суппозитории вагинальные.

Фармакотерапевтическая группа: Антисептические и противомикробные средства для применения в гинекологии (исключая комбинации с кортикостероидами). Антибиотики. Натамицин.

Показания к применению:

Вагиниты, вульвиты, вульвовагиниты, вызванные главным образом грибами Candida.

Способ применения и дозы:

Натацин применяют по 1 вагинальному суппозиторию 1 раз в сутки на ночь в течение 3-6 дней.

Суппозиторий следует извлечь из оболочки и ввести глубоко во влагалище в положении лежа.

Применение у лиц с заболеваниями печени и почек: без особенностей.

Применение у пожилых пациентов: не требует коррекции режима дозирования.

Побочное действие:

Подобно всем лекарственным средствам Натацин может вызывать нежелательные реакции, но они возникают не у всех. Зарегистрированы следующие нежелательные реакции:

Общие расстройства и нарушения в месте введения:

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000): раздражение, зуд, чувство жжения в области вульвы и влагалища.

Сообщение о нежелательных реакциях.

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, или производителю (контактные данные см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Передозировка:

При вагинальном применении натамицин не всасывается, поэтому не оказывает системного действия.

При случайном проглатывании препарат не вызовет токсических реакций, т.к. не всасывается в ЖКТ.

Меры предосторожности:

Суппозитории вагинальные под действием температуры тела быстро растворяются, образуя

пенистую массу, что способствует равномерному распределению активной субстанции.

Цетиловый спирт, который входит в состав вагинальных суппозиториев, может вызвать чувство жжения в генитальной области при повышенной чувствительности к данному компоненту.

Во время менструаций терапию суппозиториями прерывают.

При применении суппозиториев нет необходимости в исключении половых контактов. Рекомендуется провести обследование половых партнеров и, в случае выявления кандидозного поражения, провести курс лечения. Использование вагинальных суппозиториев может снизить надежность барьерной контрацепции (презервативы, вагинальные диафрагмы) за счет взаимодействия основы для суппозиториев с латексом или каучуком.

Применение в период беременности и лактации:

Возможно применение Натацина в период беременности и кормления грудью.

Применение пожилыми пациентами:

Без особенностей.

Применение у пациентов с нарушениями функции печени и почек:

Натацин действует местно. Системная абсорбция действующего вещества практически отсутствует, поэтому нарушение функции печени или почек у пациента не требует изменений режима дозирования.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами:

Не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие натамицина не описано. Вещества, обладающие окислительными свойствами, такие как пероксиды, перманганат, йод, гипохлориты и т.д., могут инактивировать натамицин.

Условия хранения:

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности: 2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска:

По рецепту врача.

Упаковка: По 3 суппозитория в контурной ячейковой упаковке. По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки в картонной пачке с инструкцией по применению.

Производитель:

ООО «Рубикон», РБ, 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62 Б, тел: +375 (212) 36-47-77, тел/факс: +375 (212) 36-37-06, www.rubikon.by, e-mail: secretar@rubikon.by

